



**Влияние изменений
биотемпературы и осадков
на биоценозы Евразии**

**Высоцкая Г.С.
ИВМ СОРАН г. Красноярск**




Биотемпература сентябрь-август




Пространственное распределение трендов биотемператур (1936-2012гг.) "+" означает статистически значимую положительную зависимость

Осадки - сентябрь-август




Пространственное распределение сумм осадков (1936-2012гг.) "+" означает статистически значимую положительную зависимость

ЕРМАКОВСКОЕ




Динамика биотемпературы на
метеостанции Ермаковское

ЕРМАКОВСКОЕ




Динамика годовых сумм осадков на метеостанции Ермаковское




Тренды изменения площадей с климатическими параметрами, пригодными для существования основных типов биоценозов (1970-2012гг.)



1936-2012




Тренды изменения площадей с климатическими параметрами, пригодными для существования основных типов биоценозов (1936-2012гг.)





Динамика изменения площадей, с климатом,
соответствующим основным типам
растительности. (40-140°E 50-80°N)




40-60°E 50-60°N





Динамика изменения площадей, с климатом, соответствующим основным типам растительности. (40-60°E 50-60°N)




60-90°E 50-60°N



Динамика изменения площадей, с
климатом, соответствующим основным
типам растительности. (60-90°E 50-60°N)





90-105°E 50-60°N




Динамика изменения площадей, с климатом, соответствующим основным типам растительности. (90-105°E 50-



(60°N)




105-125°E 48-55°N




Динамика изменения площадей, с климатом, соответствующим основным типам растительности. (105-125°E 48-55°N)



40-60°E 60-70°N




Динамика изменения площадей, с климатом, соответствующим основным типам растительности. (40-60°E 60-70°N)





ШКАЛА ГЛУБИИ И ВЫСОТ В МЕТРАХ
глубже 7000 5000 4000 3000 2000 200 0 500 1000 2000 3000 4000 выше

МАСШТАБ 1:25 000 000
0 250 500 750 1000 км


60-90°E 60-74°N




Динамика изменения площадей, с климатом, соответствующим основным типам растительности. (60-90°E 60-74°N)




90-130°E 60-77°N



Динамика изменения площадей, с климатом, соответствующим основным типам растительности. (90-130°E 60-77°N)



130-180°E 60-72°N



Динамика изменения площадей, с климатом, соответствующим основным типам растительности. (80-120°E 70-77°N)

Спасибо за внимание